

## **FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE**

### **STUGERON® FORTE COMPRIMIDOS 75 MG**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

#### **COMPOSICION:**

Cada comprimido contiene:  
Cinarizina                    75 mg  
Excipientes                    c.s.

#### **PRESENTACION:**

Envases conteniendo 20 y 60 comprimidos con 75 mg de cinarizina.

#### **CLASIFICACION:**

Antagonista selectivo del Calcio.

#### **INDICACIONES:**

##### **Trastornos de la circulación cerebral**

- Terapia de mantención para síntomas de trastornos laberínticos, incluyendo vértigo, mareos, tinito, nistagmo, náuseas y vómitos.
- Profilaxis de la cinetosis.
- Profilaxis de la migraña.
- Terapia de mantención para los síntomas de origen cerebro vascular que incluyen mareo, tinito, cefalea vascular, trastornos de la sociabilidad e irritación, pérdida de memoria y falta de concentración.
- Terapia de mantención para síntomas de trastornos circulatorios periféricos que incluyen el fenómeno de Raynaud, la acrocianosis, la claudicación intermitente, los trastornos tróficos, las úlceras tróficas y varicosas, parestesias, calambres nocturnos y extremidades frías.

#### **CONTRAINDICACIONES:**

**STUGERON® FORTE** esta contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a la droga.

## **INTERACCIONES:**

Alcohol / depresores SNC / antidepresivos tricíclicos: El uso concomitante puede potenciar los efectos sedantes de los medicamentos mencionados o de **STUGERON® FORTE**

Interferencia Diagnóstica: Debido a su efecto antihistamínico, **STUGERON® FORTE** puede prevenir reacciones dérmicas positivas a indicadores de reactividad dérmica si se usa hasta 4 días antes del test cutáneo.

## **PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS:**

Como con otros antihistamínicos **STUGERON® FORTE** puede causar distress epigástrico; ingiriendo la droga después de las comidas la irritación gástrica puede ser disminuida.

En pacientes con enfermedad de Parkinson **STUGERON® FORTE** debe ser solo administrado si las ventajas sobrepasan el posible riesgo de agravar esta enfermedad.

**STUGERON® FORTE** puede causar somnolencia especialmente al inicio del tratamiento. Por lo tanto, debe tenerse cuidado cuando se administra alcohol u otros depresores del Sistema Nervioso Central en forma concomitante.

### **Embarazo y Lactancia**

Aún cuando en estudios en animales **STUGERON® FORTE** no ha mostrado efectos teratogénicos, como con todas las otras drogas, **STUGERON® FORTE** debe usarse durante el embarazo solo si los beneficios terapéuticos justifican los riesgos potenciales para el feto.

No existen datos sobre la excreción de **STUGERON® FORTE** en la leche humana: la lactancia materna debe ser por lo tanto desaconsejada en mujeres usando **STUGERON® FORTE**

### **Efectos sobre la capacidad de conducir y operar maquinaria:**

Dado que la administración de **STUGERON® FORTE** puede provocar somnolencia, especialmente al comienzo del tratamiento, deben tomarse precauciones si se administra la droga en pacientes que efectúen actividades tales como la conducción o el manejo de maquinarias peligrosas.

## **REACCIONES ADVERSAS:**

Puede ocurrir somnolencia y trastornos gastrointestinales. Estas manifestaciones son generalmente transitorias y pueden a menudo ser prevenidas alcanzando la dosis óptima en forma gradual. En raros casos, cefalea, sequedad bucal, aumento de peso, perspiración o reacciones alérgicas pueden ser observados. Similarmente, se han reportado algunos raros casos de líquen plano y de síntomas pseudoelupicos. En la literatura médica se han reportado algunos casos aislados de ictericia colestasica. En personas mayores, casos de agravamiento o aparición de síntomas extrapiramidales

algunas veces asociadas con sentimientos depresivos, han sido descritos durante terapia prolongada. El tratamiento debe ser discontinuado en tales casos.

### **SOBREDOSIS:**

Se ha reportado un único caso de sobredosis (2100 mg) en un niño de 4 años, en el cual se observaron las siguientes manifestaciones: vómitos, somnolencia, coma, trémor, hipotonía. La recuperación presentó problemas.

No existe un antídoto específico, pero en caso de sobredosis puede efectuarse lavado gástrico así como también administración de carbón activado.

### **DOSIS Y ADMINISTRACION:**

#### Dosis

La que su médico le indique.

#### Administración

Via oral.

**STUGERON® FORTE** se administrara preferentemente después de las comidas.

### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Almacenar en lugar seco.

Proteger de la luz.

Almacenar entre 15°C y 25°C.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

**Fecha de aprobación ISP: 26 de Julio de 2001**